

## 眼肌麻痹性偏头痛临床特征与神经眼科联合诊疗分析

首页 > > 2025年20期 > 眼肌麻痹性偏头痛临床特征与神经眼科联合诊疗分析

(整期优先) 网络出版时间: 2026年4月18日

作者: 李杰 王春娥

>

眼肌麻痹性偏头痛临床特征与神经眼科联合诊疗分析

李杰 王春娥通讯作者

济南市济阳区人民医院 251400

摘要

目的 分析眼肌麻痹性偏头痛的临床特征, 探讨神经内科与眼科联合诊疗的应用价值。方法 选取2023年1月—2025年6月本院收治的眼肌麻痹性偏头痛患者76例, 随机分为常规组(37例)与联合组(39例)。常规组行神经内科单一诊疗; 联合组实施神经眼科联合评估、诊断、治疗与康复。对比两组临床特征、确诊时间、症状缓解时间、复发率及生活质量评分。结果 76例患者中, 动眼神经麻痹51例(67.1%)、外展神经麻痹16例(21.1%)、滑车神经麻痹9例(11.8%); 头痛多为单侧眶周搏动性痛, 伴恶心呕吐、畏光畏声。联合组确诊时间、症状缓解时间显著短于常规组( $P < 0.05$ ); 复发率更低、生活质量评分更高( $P < 0.05$ )。结论 眼肌麻痹性偏头痛以单侧头痛伴眼肌麻痹为核心特征, 动眼神经最易受累; 神经眼科联合诊疗可缩短确诊周期、提升疗效、降低复发、改善预后, 值得临床推广。

关键词: 眼肌麻痹性偏头痛; 临床特征; 动眼神经麻痹; 神经眼科; 联合诊疗